























































Calendario de Vacunación Para Niños

Vacunas y exámenes para niños sanos: Desde que nacen hasta los 17 años

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan vacunas anuales contra la gripe para niños a partir de los 6 meses de edad. Para saber si su hijo las necesita, consulte con su doctor al comienzo de la estación de la gripe. En la próxima visita de su hijo, no olvide decirle al doctor si su hijo viajará fuera de los Estados Unidos. Es posible que necesite más vacunas. Si su hijo no tiene todas las vacunas que necesita, el doctor puede hacer un plan para que las reciba.

 Examen para niños sanos  Examen de sangre  Examen de la visión  Examen de los oídos  Vacunas  FLU SHOT Consulte sobre la vacuna contra la gripe.	
Edad	Vacunas y Pruebas Recomendadas
Recién nacido	   (Hepatitis B)
3 a 5 días	
7 a 14 días	
2 meses	  (DTaP, hep. B, Hib, PCV, rotavirus, IPV)
4 meses	  (DTaP, Hib, PCV, rotavirus, IPV)
6 meses	  (DTaP, Hep B, PCV, Hib & rotavirus si es necesario, IPV) 
9 meses	 
12 meses	  (MMR, hepatitis A, varicela, Hib, PCV) 
15 a 18 meses	  (DTap) 
2 años	  (Hepatitis A) 
3 años	 
4 años	     (DTaP, IPV, varicela, MMR) 
5 años	 
6, 8 y 10 años	 
11 años	  (HPV: 2 o 3 dosis aplicadas con 6 meses de diferencia), Tdap, MCV) 
12 años	 
13 años	  (Análisis de sangre para detectar varicela, si no tiene la vacuna ni antecedentes de la enfermedad) 
14 y 15 años	 
16 años	  (Dosis de refuerzo de la MCV) 
17 años	 

VACSCH07152019

DTaP: difteria, tétanos, tosferina. **Hep B:** hepatitis B. **Hib:** haemophilus influenza tipo B.
PCV: vacuna antineumocócica conjugada. **IPV:** vacuna antipoliomielítica.
MMR: sarampión, paperas, rubéola. **HPV:** virus del papiloma humano.
Tdap: difteria, tétanos, tosferina. **MCV:** vacuna antimeningocócica conjugada.